

راهنمای استفاده از ترالی احیا نوزاد

۱۴۰۲ پائیز

ترالی احیای نوزاد در اتاق زایمان و اتاق عمل سزارین

ملزومات مورد نیاز و ترالی احیای نوزاد در بخش زایمان، اتاق عمل سزارین و اورژانس زایمان مطابق دستور عمل ابلاغی پیوست ۲ می باشد.

لازم به ذکر است ترالی احیای بزرگسال در این بخش ها طی نامه شماره ۴۰۰/۳۹۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ تاریخ ابلاغ شده است.

ترالی احیای نوزاد در بخش های بستری نوزادان

در همه بخش های بستری نوزاد با عناوین مختلف شامل NICU و بخش نوزادان، از ترالی احیای نوزاد با ملزومات ویژه بخش های بستری نوزاد استفاده شود.

لازم به ذکر است در مراکزی که بخش نوزادان ندارند و صرفا چند تخت در بخش کودکان / ... به منظور بستری نوزادان نیز باید ترالی احیای نوزاد با ملزومات ویژه بخش های بستری نوزاد داشته باشند.

ملزومات و تجهیزاتی که در شناسنامه ترالی مزبور با علامت * مشخص شده اند و مختص بخش NICU هستند شامل:

- تشك گرمایی برای نوزادان بسیار نارس
- نمایشگر الکترونیکی قلب نوزاد (ECG)
- لیدهای ECG کودکان
- استایلت
- کیسه پلاستیکی ویژه نوزادان بسیار نارس (سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته)

ملزومات و تجهیزاتی که در شناسنامه ترالی با علامت ** مشخص شده اند و مختص بخش نوزادان و اتاق نگهداری نوزادان بستری هستند شامل:

- دستگاه ساکشن پرتابل
- بلندر
- تجهیزات مصرفی مانند آنزیوکت آبی شماره ۲۲
- سه راهی آنزیوکت
- هپارین لاک

به منظور آمادگی و فراهم سازی به موقع تجهیزات و ملزومات ضروری برای احیای بزرگسالان و اینمیتی کارکنان و مادران حاضر در بخش های بسته نوزادان، بسته احیای بزرگسال در قالب کیف احیای بزرگسال شامل محتویات زیر باید در طبقه پنجم تراالی قرار بگیرد.

محتویات کیف احیای بزرگسال:

منطبق با دستور عمل کشوری استانداردهای دارویی بخش اورژانس بیمارستانی (ویرایش هشتم)

نامه شماره ۴۰۰/۳۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ :

داروها:

- آمپول اپی نفرین*: 1mg/mL (1:1000) به تعداد ۵ عدد
- آتروپین*: 0.5 mg/ml, 1mL به تعداد ۵ عدد
- آمیودارون*: 50 mg/ml, 3ml به تعداد ۳ عدد
- لیدوکایین %.۲: 20 mg/ml, 5mL به تعداد ۳ عدد
- آدنوزین*: 3 mg/ml, 2mL به تعداد ۳ عدد
- دوبامین*: 40 mg/ml, 5mL به تعداد ۲ عدد
- نالوکسان: 0.4 mg/ml, 1mL به تعداد ۵ عدد
- دیازپام: 5 mg/ml, 2mL به تعداد ۵ عدد
- کلسیم گلوکونات*: 10%: 100 mg/ml, 10mL به تعداد ۳ عدد
- نور اپی نفرین*: 1 mg/ml, 4mL به تعداد ۳ عدد
- سولفات منیزیم*: 50%: 50mL به تعداد ۲ ویال
- دکستروز: 50% 50mL به تعداد ۲ عدد

تجهیزات:

- بگ بزرگسال: بگ تهويه مصنوعی بزرگسال از جنس سيليكون، دارای کيسه يا لوله ذخيره اكسيژن به همراه ماسک شفاف يك بار مصرف صورت يك عدد
- ماسک اكسيژن صورت (Face Mask) به همراه لوله رابط در سايز بزرگسال يك عدد
- لارنگوسکوپ: لارنگوسکوپ بزرگسالان با تيغه هاي ۳ و ۴ از هر کدام يك عدد به همراه دو عدد باتری يدک و يك عدد لامپ يدک لارنگوسکوپ
- لوله تراشه: لوله تراشه کاف دار در اندازه هاي ۶/۵، ۷/۵، ۸/۵ از هر کدام حداقل ۲ عدد

- Airway: راه هوایی دهانی (Oral Airway) یک بار مصرف در اندازه های مختلف بزرگسال از هر کدام یک عدد
- کاتتر نلاتون: قرمز، نارنجی، سبز از هر کدام دو عدد
- ماسک حنجره ای بزرگسال (LMA) دو عدد

تذکر مهم: داروهایی که در کیف احیای بزرگسال با (*) مشخص شده اند نیاز به استفاده از مانیتورینگ قلبی هنگام تجویز دارند.

دارو و تجهیزات احیای نوزاد در ترالی بخش اورژانس

- آمپول اپی نفرین L (1:10000) 0.1mg/10mL تزریقی به تعداد ده عدد در کشوی اول اضافه گردد.
- آمپول اپی نفرین L (1:1000) 1mg/1mL تزریقی به تعداد ده عدد در کشوی دوم ردیف ۲۶ به لیست دارویی ترالی احیا اضافه شود
- ست تزریق داخل استخوان (اینتراؤسیوس) طبقه سوم اضافه شود (اختیاری)
- استیلت به کشوی طبقه چهارم اضافه شود.
- LMA شماره یک دو عدد، پروپ نوزادان برای مانیتورینگ قلبی، لوله تراشه بدون کاف شماره ۴ به تعداد دو عدد در کشوی طبقه ۵ اضافه شود.
- وجود تی پیس احیا و تشک گرمایی برای نوزادان بسیار نارس، اختیاری است.

ترالی احیای نوزاد بخش های پس از زایمان (post partum) یا بخش هم اتفاقی مادر و نوزاد (Rooming In) در بخش های پس از زایمان و هم اتفاقی مادر و نوزاد که مادر بستری بوده و نوزاد سالم همراه مادر در بخش مراقبت می شوند ترالی احیا همان ترالی ابلاغی احیای بزرگسال بخش اورژانس مطابق با دستور عمل مدیریت بیمارستانی است.